

Τρικαΐνη Pharmaq 100%



- Λευκή σκόνη για διάλυση στο νερό.
- Μεθανοσουλφονική Τρικαΐνη 100%
- Χρησιμοποιείται σε εμβάπτιση για νάρκωση, ακινητοποίηση και αναισθησία τόσο των διακοσμητικών όσο και των βρώσιμων ψαριών.
- Ενδείξεις για χρήση περιλαμβάνουν μεταφορά, ζύγιση, μαρκάρισμα, σήμανση, στη διάρκεια συλλογής σπέρματος και ωαρίων των γεννητόρων, δειγματοληψία αίματος και χειρουργικών διαδικασιών.

Διατίθεται σε συσκευασίες 1kg.

Φαρμακευτικές Προειδοποιήσεις

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C

Να προστατέψετε το προϊόν από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος.

Να διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο για να προστατεύεται από την υγρασία.

Τα διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατά την ημέρα παρασκευής τους και να τα προστατέψετε από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Να μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Γενικές Προφυλάξεις

Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Παρουσίαση

Σκόνη Μεθανοσουλφονικής Τρικαΐνης 100% για διάλυμα για νάρκωση και αναισθησία ψαριών.

Χρόνος Αναμονής

- Τα ψάρια δεν πρέπει να εξαλειφούνται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Τα ψάρια μπορούν να εξαλειφούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, μόνο 70 βαθμοήμερες μετά την τελευταία θεραπεία.

Αντενδείξεις

- Μην υπερβείτε την συνιστώμενη δόση για κάθε κατηγορία ψαριών.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα ακόλουθα τροπικά είδη ψαριών:
Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirez, *Balantiocheilos melanopterus*, *Eetroplus suratensis*, *Melanotaenia maccullochi*, *Monodactylus argenteus*, *Phenacogrammus interruptus* και *Scatophagus argus*

Περιβαλλοντικές Προειδοποιήσεις

Η διάθεση του προϊόντος και του διαλυμάτων του με ταφή σε έδαφος λυμάτων μακριά από υδάτινα ρεύματα.

Προειδοποιήσεις Χρήστη

- Να φοράτε αδιάβροχα γάντια από καουτσούκ κατά το χειρισμό του προϊόντος ή του διαλύματος.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος.
- Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στην Τριακάϊνη Pharmaq κατά τη χρήση της θα πρέπει να αναφερθεί στην PHARMAQ Ltd από τον χρήστη με λεπτομέρειες όλων των συνθηκών που επικρατούν.

Δοσολογία και μέθοδος εφαρμογής

Ένας αριθμός παραγόντων επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου της συγκεντρώσεως του φαρμάκου στο νερό, της διάρκειας της έκθεσης, της θερμοκρασίας, της περιεκτικότητας σε οξυγόνο και της πυκνότητας της βιομάζας.

Εξαιτίας αυτών των μεταβλητών παραγόντων συστήνεται αυστηρά η δοκιμή της επιλεγμένης συγκέντρωσης του φαρμάκου και του χρόνου έκθεσης με ένα μικρό αντιπροσωπευτικό γκρουπ ψαριών προτού γίνει θεραπεία σε μεγάλο αριθμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η θερμοκρασία του νερού είναι στα μέγιστα ή στα ελάχιστα όρια του φυσιολογικού εύρους θερμοκρασίας για τα χειριζόμενα είδη. Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε νερό της ίδιας σύνθεσης και χαρακτηριστικών με αυτό που είναι συνηθισμένα τα ψάρια. Καθώς το προϊόν έχει καλή υδατική διαλυτότητα, μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο δοχείο. Οι επιδράσεις στα ψάρια θα πρέπει να καταγράφονται καθώς το προϊόν χορηγείται προοδευτικά.

Πριν την αναισθησία ή την παρατεταμένη νάρκωση, τα ψάρια θα πρέπει να παραμείνουν νηστικά για 12 έως 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να είναι σε πυκνότητα που δεν ξεπερνά τα 80g/lit. Για να περιορίσετε πιθανή ζημιά και απώλεια όταν υπόκεινται σε αναισθησία για μεγάλες περιόδους για μεταφορά κλπ. το επίπεδο της νάρκωσης θα πρέπει να επιτρέπει στα ψάρια να διατηρήσουν την ισορροπία και την κολυμβητική τους ικανότητα. Αερισμός θα πρέπει να παρέχεται εκτός και εάν η νάρκωση ή η αναισθησία είναι μικρής διάρκειας.

Στην αναισθησία η απώλεια των αντανάκλαστικών λαμβάνει μέρος σε ένα έως δεκαπέντε λεπτά μετά την εμβάπτιση, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση. Ναρκωμένα ψάρια θα πρέπει να μεταφέρονται από το «φαρμακούχο» νερό και να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον το συντομότερο δυνατόν, ενώ η ανάνηψη θα επέλθει μεταξύ ενός και τριάντα λεπτών.

Τα παρακάτω παραδείγματα των δοσολογιών και των χρόνων έκθεσης είναι βασισμένα σε εργαστηριακή εμπειρία και εμπειρία πεδίου:

		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ mg/litre νερού	ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ λεπτά
Είδη Πέστροφας (7-17°C)			
Νάρκωση		10-30	Έως 480
Αναισθησία:	Ελαφριά	30-80	Έως 30
	Βαθύτερη	80-180	Έως 10
Είδη Σολομού:			
Νάρκωση		7-30	Έως 240
Αναισθησία:	Ελαφριά	30-80	Έως 10
	Βαθύτερη	80-100	Έως 5
Είδη Λαβρακιού			
Νάρκωση		8-30	Έως 480
Αναισθησία:	Ελαφριά	30-70	Έως 20
	Βαθύτερη	70-100	Έως 4
Είδη Κυπρίνου			
Νάρκωση		20-30	Έως 1440
Αναισθησία:		30-200	Έως 8
Τροπικά ψάρια γλυκού νερού			
Νάρκωση		30-50	Έως 1440