

# VIROCID



## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ – ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

### ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ:

- ΙΩΝ (μεταξύ άλλων Avian Influenza, FMD, PRPS, Cumoro, Aujeazky, Swine Fever)
- ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
- ΜΥΚΗΤΩΝ

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

Αλκυλ-διμεθυλ-βενζυλ-χλωριούχο αμμώνιο	170,60 g/l
Διδεκυλ-διμεθυλ χλωριούχο αμμώνιο	78,00 g/l
Γλουτεραλδεΰδη	107,25 g/l
Ισοπροπανόλη	146,25 g/l
Έλαιο πεύκου	20,00 g/l

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για την απολύμανση: χώρων, οχημάτων και εξοπλισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, βουστάσια), σφαγεία, εκκολαπτήρια.

Σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας για την απολύμανση εξοπλισμού, δεξαμενών εκτροφής, μέσων μεταφοράς ψαριών, οχημάτων και για ποδόλουτρα εισόδου.

Σε νοσοκομεία, κλινικές ζώων και ιατρεία για την απολύμανση δαπέδων, τοίχων, εξοπλισμού, επίπλων, χώρων υγιεινής, κλπ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Εφαρμόζεται με τα ακόλουθα συστήματα και συγκεντρώσεις και αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός:

- A. Με ψεκασμό: 1 l διαλύματος (0,25-0,5%) ανά 4m<sup>2</sup> επιφάνειας, χρόνος επαφής 20 λεπτά.
- B. Με αφρισμό: Συγκέντρωση 0,5% και εφαρμογή ώστε να καλυφθούν πλήρως οι επιφάνειες.
- Γ. Με καπνισμό: 1 l προϊόντος + 4l νερό ανά 1.000 m<sup>3</sup> όγκου.
- Δ. Με εμβάπτιση: Συγκέντρωση 0,5%.

Το προϊόν διατηρείται σταθερό κατά την αποθήκευση για 3 έτη. Μετά την αραίωση προς χρήση ο χρόνος ζωής του διαλύματος είναι 2 μήνες.

Αποθηκεύσατε σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία μη υπερβαίνουσα τους 40°C.

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε μονάδες που διαθέτουν βιολογικό & χημικό καθαρισμό.

Το VIROCID δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως αποστειρωτικό τελικού σταδίου σε καμία επιφάνεια ή εργαλείο η οποία εφαρμόζεται άμεσα στο ανθρώπινο σώμα ή έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους.

Η χρήση του να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10L

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Βλέπε Συσκευασία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΦ: 31202/06

